

<b>Prévention</b>	<b>1<sup>ère</sup></b>	<b>2<sup>ème</sup></b>	<b>3<sup>ème</sup></b>
<b>Objectif</b>	Combattre la maladie avant qu'elle n'affecte l'individu → réduire le nombre de cas / éviter le nombre de nouveaux cas.	Dépister et traiter les maladie ayant déjà provoqué une altération pathologique, mais n'ayant pas encore atteint le stade de la maladie où le patient va se faire soigner tout le temps.	Intervenir après la survenue de la maladie et après les soins pour éviter les rechutes, récurrences, séquelles dues à la maladie.
<b>Points sensibles</b>	Maladie elle même Facteurs de risques Troubles précurseurs fonctionnels ou morphologiques	Maladie au stade initial. Réversible, subclinique ou paucisymptomatique accessible à un dépistage simple.	Maladie au stade avancé. Altérations peu réversibles, évolution chronique avec rechutes, handicap, invalidités et dépendance.
<b>Interventions</b>	Mesures générales de promotion de la santé dans la population. Mesures spécifiques aux sujets. Élimination de ces troubles.	Dépistage précoce et efficace. Traitement précoce et efficace.	Soins médicaux et sociaux. Contrôler l'évolution de la maladie.
<b>Impact épidémiologique</b>	Réduire l' <b>incidence</b> . → Démarche préventive	Réduire la <b>prévalence, durée de vie, impact</b> . → démarche préventive	<b>Nul</b> , ne modifie ni l'incidence ni la prévalence. → démarche curative.
<b>Exemples</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccinations</li> <li>• Promotion du préservatif</li> <li>• Tout matériel stérile</li> <li>• Don de sang pour receveur du culot.</li> <li>• Prévention du partenaire de la personne avec le SIDA.</li> <li>• Prévention de l'infection chez l'enfant à naître.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépistage maladie chronique (l'individu ne présente pas de symptômes)</li> <li>• Prévention des infections opportunistes vivant avec le VIH.</li> <li>• Don de sang pour donneur du sang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise en charge des handicaps.</li> <li>• Bonne observance des prescriptions.</li> </ul>

**Universelle** : vers l'ensemble de la population quel que soit son état de santé → promotion de la santé. (règle d'hygiène etc)

**Orientée ou sélective** : vers les sujets exposés → prévention de la maladie des sujets qu'ils présentent ou non des facteurs de risques. (vaccination)

**Ciblée aux malades** : éducation thérapeutique → éviter les complications (prévention)